


**Rhinopharyngites**



Le nombre moyen des rhinopharyngites est stable, 75 % des médecins en ont signalé au moins trois.

**Moyenne nationale 4,8**


**Surveillance Territoriale des Infections et Maladies respiratoires**

Nombre de cas vus en consultation ou en visite dans la journée du : **Lundi 5 février 1990**

Augmentation Stationnaire Diminution  
par rapport au lundi 29 janvier

Etude réalisée auprès de 150 médecins généralistes répartis sur l'ensemble du territoire. La variation par Région a été standardisée, les résultats de l'évolution par Région sont fournis avec une confiance de 70 %. Les résultats complets de cette enquête sont disponibles sur minitel 36-16 code STIM 2.


**Angines**



Le nombre moyen des angines est stable, 17 % des médecins en ont signalé au moins trois.

**Moyenne nationale 1,1**

**Bronchites**



Le nombre moyen des bronchites est stable, 29 % des médecins en ont signalé au moins trois.

**Moyenne nationale 1,9**


**Bronchiolites**



Le pourcentage des médecins ayant signalé au moins un cas de Bronchiolite est de 22 %.

**Moyenne nationale 0,3**

**Bronchite chronique surinfectée**



Le pourcentage de médecins ayant signalé au moins un cas de surinfection de bronchite chronique est de 29 %.

**Moyenne nationale 0,4**

**Biostim Enfant 1mg**

**COMPOSITION** : Glycoprotéines extraites de *Klebsiella pneumoniae* retenues sur membrane de porosité moyenne 0,011 micromètre : 1,00 mg. Excipient : q.s.p. une gélule n°2 de 230,00 mg. **PROPRIETES** : immunomodulateur actif sur les différentes populations cellulaires et certains médiateurs immunologiques impliqués dans les défenses anti-infectieuses. **ELEMENT DE PHARMACOCINETIQUE** : cf Vidal. **INDICATIONS THERAPEUTIQUES** : traitement prophylactique des infections respiratoires récidivantes chroniques (depuis deux ans ou plus ou après amygdalotomie). **CONTRE-INDICATIONS** : Dans l'état actuel des connaissances, l'utilisation du BIOSTIM est à éviter de principe chez les malades présentant une maladie auto-immune. Enfant de moins d'un an. **MISE EN GARDE** : il est recommandé de respecter le cadre posologique : cure annuelle de 4 boîtes. Pas d'utilisation prolongée du médicament. **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION** : Schéma thérapeutique : une cure par mois pendant trois mois consécutifs, soit : 1<sup>ère</sup> cure de 8 jours : 2 gélules par jour, arrêt 3 semaines ; 2<sup>ème</sup> cure de 8 jours : 1 gélule par jour, arrêt 3 semaines ; 3<sup>ème</sup> cure de 8 jours : 1 gélule par jour. En cas de besoin, la gélule peut être ouverte et, dans ce cas, son contenu est mélangé à un liquide ou un aliment aisément ingérable. **PRESENTATION** : 8 gélules sous plaquettes thermofonnées. Coût du traitement journalier : 2,40 F. Coût du traitement annuel : 158,40. PRIX : 39,60 F (8 gélules). Remb. Séc. Soc. à 40 % et Collect. Commercialisé depuis 1989. Pour une information plus complète, se reporter au Vidal.

Laboratoires Cassenne, 3 square Desaix, 75015 Paris-Tél.45.78.61.70

